Elanco

PRIMER Y ÚNICO MEDICAMENTO APROBADO PARA LA ANEMIA NO REGENERATIVA POR ERC EN GATOS

Nuevo y único medicamento veterinario oral de molidustat, con perfil de seguridad comprobado y fácil de administrar, **para el manejo de la anemia no regenerativa asociada a ERC en gatos.**





Varenzin™

NUEVO

EPO

Estimula la producción de **eritropoyetina (EPO) endógena**

Jarabe con aceite de pescado **bien aceptado por los gatos**[3*]


Tratamiento en casa

¿Por qué es importante tratar la anemia en gatos con ERC?

La enfermedad renal crónica es una de las principales causas de anemia en los gatos. **Hasta el 65% de los gatos con ERC desarrollan anemia no regenerativa.**[1]

La anemia por ERC **disminuye significativamente la calidad de vida y se asocia con una reducción de la supervivencia**[2], aunque, a menudo, se pasa por alto debido a las opciones limitadas de tratamiento.





Varenzin: nuevo y único medicamento veterinario de su clase

Varenzin establece un nuevo estándar en el **manejo temprano de la anemia no regenerativa asociada a ERC**. Esta innovadora suspensión oral de molidustat te ofrece una solución pionera basada en el modo de acción ganador del Premio Nobel en Medicina en 2019.[5]

Con Varenzin, el manejo de la anemia **es más sencillo**, mejorando la calidad de vida de tus pacientes felinos, sin necesidad de análogos de eritropoyetina fuera de registro.




1 de cada 4 veterinarios cree que Varenzin® les ayudaría a facilitar el manejo temprano de la anemia asociada a ERC en gatos.[6]

En una serie de estudios multicéntricos, se ha demostrado que Varenzin ofrece una alternativa con un perfil de seguridad y eficacia comprobados para tratar la anemia no regenerativa asociada a ERC en gatos.



La evidencia científica que respalda Varenzin®

Un estudio de campo que incluyó 75 gatos con anemia por ERC demostró que el hematocrito (HCT) promedio de los gatos tratados con molidustat aumentó un 5,5% en comparación con el grupo de control:[7]



En gatos sanos, el rango normal de HCT es del 25-45%.[8]


El 68% de los gatos tratados con Varenzin® alcanzó el éxito de tratamiento en 28 días.[7]

El éxito se definió como un aumento de 4 puntos porcentuales o más en el HCT medio y/o un aumento del 25% respecto al HCT basal.

Evolución del Hematocrito con Varenzin[9]

Aumenta el HCT a los 14 días después de empezar el tratamiento y sigue aumentando progresivamente hasta el día 84.[9]

*Se debe monitorizar el HCT semanalmente a partir del día 14 hasta el día 28 de tratamiento para asegurar que no exceda el límite superior del rango de referencia. Posteriormente, se mantendrá el tratamiento con revisiones periódicas si el HCT es < 28%, o se pausará el tratamiento si el HCT es > 28%.




Varenzin: perfil de seguridad y eficacia comprobados

Varenzin™ NUEVO

Estimula la producción de EPO endógena

Varenzin actúa inhibiendo la prolil hidroxilasa de los factores inducibles por hipoxia (HIF-PH), enzima que bloquea la producción de EPO.[4]



- **Mayores niveles de EPO** conducen a una mayor producción de glóbulos rojos y, por tanto, a un mejor suministro de oxígeno a todo el organismo.


Fácil de administrar



- **Administración 1 vez al día**
  5 mg/kg - 0,2 ml/kg - viene con jeringa
  Se puede conservar a temperatura ambiente**
  Frasco con 27 ml - aprox. 1 mes de tratamiento (para un gato de 4,5kg)
- **Comenzar tratamiento si el HCT <25% o está entre 25 - 28% durante al menos 1 mes.**
  Escanea el QR para ver la guía de tratamiento paso a paso:



Suspensión oral diseñada para gatos



- Jarabe con aceite de pescado **bien aceptado por los gatos.**[3*]
- **Tratamiento en casa,** con la comodidad que los gatos merecen.

88% de tasa de aceptación voluntaria por los gatos[3*]

ERC: Enfermedad Renal Crónica; EPO: Eritropoyetina. *Estudio realizado en gatos sanos. **No conservar por encima de 30ºC.

1- Chalhoub S, et al. Anemia of renal disease: what it is, what to do and what's new. J Feline Med Surg. 2011;13(9):629-40. **2-** New therapeutic approaches to management of anemia and iron metabolism in chronic kidney disease. https://www.iriskidney. com/treatment-of-anemia-in-cats-with-ckd. **3-** Mangold-Gehring. S. et al. EXPRESS: Palatability of sunflower oilbased versus aqueous verum formulations of molidustat in healthy cats. J Feline Med Surg. 2026 Feb 20:1098612X261428943. **4-** Nupur Gupta, MD, and Jay B. Wish, MD, 2017. Hypoxia-Inducible Factor Prolyl Hydroxylase Inhibitors: A Potential New Treatment for Anemia in Patients With CKD. Am J Kidney Dis. 2017;69(6):815-826. **5.** The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach 2026. Fri. 20 Feb 2026. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/summary/>. **6.** Data on file - Varenzin Market research with 202 Veterinarians in USA and Germany (2019). **7.** Schmidt et al. Effectiveness and long-term safety of repeated oral administrations of molidustat in the management of anemia associated with chronic kidney disease in cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, Volume 40, Issue 1, JanuaryFebruary 2026, aalaf079. **8.** Cornell feline health center. https://www.vet.cornell.edu/departments-centersandinstitutes/cornell-feline-health-center/health-information/felinehealthtopics/anemia#:~:text=Packed%20Cell%20Volume%20(PCV%2C%20also,below%2025%25%20is%20considered%20anemic. Consulted on 31/03/2026. **9.** Charles et al, Use of molidustat, a hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor, in chronic kidney disease-associated anemia in cats. J Vet Intern Med. 2023 Sep 22;38(1):197–204.

Varenzin, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. ©2026 Elanco Animal Health, Inc. o sus filiales. PM-ES-26-0091

Accede a la ficha técnica