
ALVEGESIC® VET 10 mg/ml

Solución inyectable de butorfanol al 1%



EQUILIBRIO EN LA SEDACIÓN

Ecuphar
An Animalcare Company

ALVEGESIC® VET 10 mg/ml

ANALGESIA MULTIMODAL

- Analgésico para dolor visceral moderado [1]
- Sedación ligera, moderada o profunda en combinación con otros productos (acepromazina, ketamina, alfaxalona, dexmedetomidina) [2]
- Anestesia [1]
- Opioide agonista-antagonista, actuando como agonista en receptores kappa (κ) y antagonista de receptores mu (μ) [1]
- El efecto analgésico puede durar hasta 60 min. en el perro y hasta 90 min. en el gato [2]
- Reversible con naloxona [1]
- Apto para uso en animales enfermos o comprometidos [2]

* Se deben tener en cuenta las propiedades antitusivas del butorfanol [1]

SEDACIÓN PLUS

El efecto sinérgico con los α-2 agonistas
facilita la manipulación de los pacientes [1, 2]



INDICACIONES

• Analgesia visceral • Sedación • Anestesia

VENTAJAS

frente al uso único de α-2 agonistas

• Potenciación de la analgesia • Sedación más profunda





Sedación Plus

En **procesos ambulatorios o breves:**

- Radiodiagnóstico
- Ecocardiografía
- Extracción de espigas
- Exploraciones dolorosas
- Suturas
- Retirada de puntos
- Drenaje de abscesos
- Biopsias cutáneas
- Tumores cutáneos
- Punciones
- Donación de sangre



perros

PESO PERRO	DEXMEDETOMIDINA [2]		ALVEGESIC [2] 0,2 mg/kg IM (ml)
	SEDACIÓN MODERADA 3-7 µg/kg IM (ml)	SEDACIÓN PROFUNDA 7-15 µg/kg IM (ml)	
2	0,01-0,03	0,03-0,06	**0,04**
3	0,02-0,04	0,04-0,09	**0,06**
4	0,02-0,06	0,06-0,12	**0,08**
5	0,03-0,07	0,07-0,15	**0,10**
6	0,04-0,08	0,08-0,18	**0,12**
7	0,04-0,10	0,10-0,21	**0,14**
8	0,05-0,11	0,11-0,24	**0,16**
9	0,05-0,13	0,12-0,27	**0,18**
10	0,06-0,14	0,14-0,30	**0,20**
12	0,07-0,17	0,17-0,36	**0,24**
14	0,08-0,20	0,20-0,42	**0,28**
16	0,10-0,22	0,22-0,48	**0,32**
18	0,11-0,25	0,25-0,54	**0,36**
20	0,12-0,28	0,28-0,60	**0,40**
22	0,13-0,31	0,31-0,66	**0,44**
24	0,14-0,34	0,34-0,72	**0,48**
26	0,16-0,36	0,36-0,78	**0,52**
28	0,17-0,39	0,39-0,84	**0,56**
30	0,18-0,42	0,42-0,90	**0,60**
32	0,19-0,45	0,45-0,96	**0,64**
34	0,20-0,48	0,48-1,02	**0,68**
36	0,22-0,50	0,50-1,08	**0,72**
38	0,23-0,53	0,53-1,14	**0,76**
40	0,24-0,56	0,56-1,20	**0,8**
45	0,27-0,63	0,63-1,35	**0,9**
50	0,30-0,70	0,70-1,50	**1,00**

gatos

PESO GATO	DEXMEDETOMIDINA [2]		ALVEGESIC [2] 0,2 mg/kg IM (ml)
	SEDACIÓN MODERADA 3-10 µg/kg IM (ml)	SEDACIÓN PROFUNDA 10-20 µg/kg IM (ml)	
1	0,01-0,02	0,02-0,04	**0,02**
2	0,01-0,04	0,04-0,08	**0,04**
3	0,02-0,06	0,06-0,012	**0,06**
4	0,02-0,08	0,08-0,016	**0,08**
5	0,03-0,10	0,10-0,20	**0,1**
6	0,04-0,12	0,12-0,24	**0,12**
7	0,04-0,14	0,14-0,28	**0,14**
8	0,05-0,16	0,16-0,32	**0,16**

ALVEGESIC® VET 10 mg/ml

Solución inyectable de butorfanol al 1%



- Agonista parcial κ y antagonista μ[1]
- Analgesia, sedación, anestesia [1]
- IV, IM y SC [1]
- Compatible y sinérgico con otras moléculas (α-2 agonistas, ketamina, acepromazina....) [1, 2]
- Inicio de acción rápido [2]:
  3-5 min. IV
  5-15 min. IM
- Duración efecto: hasta 60 minutos en perro y 90 en gato [2]

Referencias:

1. SPC Alvegesic.
2. Grubb et al. 2020 AAHA Anesthesia and Monitoring Guidelines for Dogs and Cats.

FICHA TÉCNICA

InoVet

V.M.D. nv/sa, member of Inovet • Hoge Mauw 900 • 2370 Arendonk • Belgium
Tel +32 14 67 20 51 • Fax +32 14 67 21 52 • info@inovet.eu • www.inovet.eu

Ecuphar
An Animalcare Company

25SP080-V2