SILVERWOOF





Omega 3

POLVO MICROENCAPSULADO



Derma | Neuro | Vital

TECNOLOGÍA DE MICROENCAPSULACIÓN

POLVO MICROENCAPSULADO
Omega-3 protegido del aire y la luz

DOSIS EXACTA EN CADA CACITO
EPA, DHA y GLA en la proporción correcta

FRESCURA GARANTIZADA
Nunca rancio, ni al final del bote

DIGESTIÓN LIGERA
Sin la grasa que provoca heces blandas

LIMPIO Y CÓMODO
Sin el pringue ni el olor fuerte del aceite

HASTA 5 VECES MENOS CALORÍAS
Que el aceite de salmón, mismo EPA y DHA

ANCHOA DE NUEVA ZELANDA
Sin mercurio ni metales pesados

SABOR SUAVE
Se integra fácilmente en la comida



Los ácidos grasos activos quedan protegidos frente a la oxidación y solo se liberan mediante digestión enzimática en el tracto digestivo

Omega 3 *Vital*

POLVO MICROENCAPSULADO
+ Astaxantina



Indicaciones: Articulaciones y órganos. Perros con desgaste articular o menor movilidad; apoyo renal, cardíaco y hepático; paciente geriátrico con comorbilidad; alternativa cuando los AINE están limitados. Prevención en razas grandes y perros que envejecen.

PVP: 39,99 € - **Presentación**: caja de 125 g - **Dosis diaria recomendada**: 1 cacito (1,1 g) por cada 6 kg de peso
Alérgenos: Contiene: **pescado** (anchoa), **leche** (caseinato sódico).
EPA: 21% | **DHA**: 14% | **Astaxantina**: 0,12%

ÁCIDOS GRASOS	Por gramo	Por cacito (1,1 g)
Omega-3 Total	**346,2 mg**	**380,8 mg**
– EPA (Ác. Eicosapentaenoico)	210,8 mg	231,9 mg
– DHA (Ác. Docosahexaenoico)	135,4 mg	148,9 mg
Omega-6 Total	**8,5 mg**	**9,4 mg**
ANTIOXIDANTES (protección celular)		
– Astaxantina (de microalga Haematococcus pluvialis)	1,19 mg	1,31 mg
– Vitamina E (acetato de all-rac-alfa-tocoferilo)	8,0 mg	8,8 mg
RATIOS		
Ratio EPA:DHA		**1,56:1**
Ratio Omega-3:Omega-6		**40,7:1**



Composición: Concentrado de aceite de pescado microencapsulado (*anchoa*, Nueva Zelanda), caseinato sódico, jarabe de glucosa seco, dextrosa, harina de microalga microencapsulada (*Haematococcus pluvialis*), aceite de colza refinado. **Componentes analíticos**: Grasa bruta 46,27% - Proteína bruta 11,15% - Cenizas brutas 7,31% - Fibra bruta 0% - Humedad 3,15%

Omega 3 *Neuro*

POLVO MICROENCAPSULADO
+ Fosfatidilserina





Indicaciones: Cerebro y cognición. Para perros senior con signos de envejecimiento mental y como apoyo de la memoria, el aprendizaje y el descanso. Útil también como prevención en perros de edad media y como apoyo cognitivo en perros jóvenes en aprendizaje.

PVP: 39,99 € - **Presentación:** caja de 125 g - **Dosis diaria recomendada:** 1 cacito (1,1 g) por cada 5 kg de peso
Alérgenos: Contiene: **pescado** (anchoa), **leche** (caseinato sódico), **soja** (lecitina).
EPA: 10% **| DHA:** 26% **| Fosfatidilserina:** 5%

ÁCIDOS GRASOS	Por gramo	Por cacito (1,1 g)
Omega-3 Total	**367,6 mg**	**404,4 mg**
– EPA (Ác. Eicosapentaenoico)	103,5 mg	113,9 mg
– DHA (Ác. Docosahexaenoico)	264,1 mg	290,5 mg
Omega-6 Total	**7,1 mg**	**7,8 mg**
ACTIVOS CEREBRALES (nutrición neuronal)		
– Fosfatidilserina (fosfolípido de membrana)	46,4 mg	51,0 mg
– DHA (Ác. Docosahexaenoico)	264,1 mg	290,5 mg
RATIOS		
Ratio DHA:EPA		**2,55:1**
Ratio Omega-3:Omega-6		**51,8:1**

Composición: Concentrado de aceite de pescado microencapsulado (anchoa, Nueva Zelanda), caseinato sódico, dextrosa, jarabe de glucosa seco, aceite de colza refinado. Emulgentes: Lecitinas (1c322): 66.300 mg/kg
Componentes analíticos: Grasa bruta 49,48% - Proteína bruta 10,59% - Cenizas brutas 6,37% - Fibra bruta 0% - Humedad 2,74%

Omega 3 *Derma*

POLVO MICROENCAPSULADO
+ Ácido Gamma-Linolénico



Indicaciones: Piel y pelaje. Para perros con piel sensible, seca o con tendencia al picor, y pelaje apagado o con caída excesiva. Apoyo dermatológico coadyuvante y mantenimiento de la barrera cutánea. Útil también como prevención en razas predispuestas a problemas de piel.

PVP: 39,99 € - **Presentación:** caja de 145 g - **Dosis diaria recomendada:** 1 cacito (1,08 g) por cada 5 kg de peso
Alérgenos: Contiene: **pescado** (anchoa), **leche** (caseinato sódico). No iniciar durante una dieta de eliminación.
EPA: 17% **| DHA:** 11% **| GLA:** 2%

ÁCIDOS GRASOS	Por gramo	Por cacito (1,08 g)
Omega-3 Total	**277,5 mg**	**299,7 mg**
– EPA (Ác. Eicosapentaenoico)	167,8 mg	181,2 mg
– DHA (Ác. Docosahexaenoico)	109,7 mg	118,5 mg
Omega-6 Total	**58,8 mg**	**63,5 mg**
– GLA (Ác. Gamma-Linolénico)	19,8 mg	21,4 mg
– LA (Ác. Linoleico)	39,0 mg	42,1 mg
RATIOS		
Ratio EPA:DHA		**1,53:1**
Ratio EPA:GLA		**8,47:1**
Ratio Omega-3:Omega-6		**4,72:1**



Composición: Concentrado de aceite de pescado microencapsulado (anchoa, Nueva Zelanda), caseinato sódico, jarabe de glucosa seco, dextrosa, aceite de borraja microencapsulado, aceite de colza refinado.
Componentes analíticos: Grasa bruta 49,08% - Proteína bruta 8,92% - Cenizas brutas 6,7% - Fibra bruta 0% - Humedad 3,4%

Omega 3 *Vital*

POLVO MICROENCAPSULADO



¿Qué perros se benefician de un Omega-3 rico en EPA + astaxantina?

INDICACIÓN	*	CONTEXTO CLÍNICO HABITUAL**	QUÉ ESPERAR Y CUÁNDO, SEGÚN LOS ESTUDIOS*
Prevención de la movilidad *(razas grandes, a partir de 7 años)*	C	Control de peso, ejercicio regular, revisión articular anual, nutracéuticos con UC-II	Mantenimiento de la movilidad y retraso de la rigidez asociada a la edad
Osteoartritis *(leve a grave)*	A	Control de peso, ejercicio de bajo impacto, fisioterapia, nutracéuticos con UC-II	Menos rigidez al levantarse en semanas 3–6, mejora de la movilidad en semanas 6–8, máximo a partir de las 12
Displasia de cadera o codo	C	Control de peso y crecimiento, ejercicio adaptado, nutracéuticos con UC-II	Apoyo articular a largo plazo, valorar movilidad cada 6 meses
Enfermedad renal crónica IRIS 1–3	A	Dieta renal, control de presión arterial, benazepril o telmisartán si proteinuria	Reducción de la proteinuria a partir de las 8–12 semanas, control cada 3 meses
Nefropatía perdedora de proteínas	A	IECA o telmisartán, dieta renal, antiagregante si hipoalbuminemia	Efecto antiproteinúrico aditivo al IECA. Reevaluar UPC a las 8 semanas
Miocardiopatía dilatada y caquexia cardíaca	A	Pimobendan, furosemida, IECA, espironolactona según estadio, nutracéuticos	Menor pérdida de masa muscular y mejor tolerancia al ejercicio en 8 semanas
Arritmias ventriculares *(Bóxer, Dóberman)*	A	Sotalol o mexiletina según Holter	Reducción de la carga arrítmica valorable en Holter a los 3 meses
Hiperlipidemia *(Schnauzer, hipotiroidismo)*	B	Dieta baja en grasa, tratar la causa endocrina, fibratos si precisa	Reducción de triglicéridos valorable a las 8–12 semanas en ayunas
Postoperatorio ortopédico *(TPLO, artroscopia)*	C	Analgesia multimodal, rehabilitación, reposo controlado	Apoyo a la recuperación funcional durante la rehabilitación
Perro deportivo o de trabajo	C	Calentamiento, control de carga, fisioterapia preventiva	Menor rigidez post-esfuerzo desde las 6–8 semanas
Enfermedad valvular mitral B1–B2 *(preclínica)*	C	Pimobendan en B2, control de peso, ejercicio moderado	Apoyo cardioprotector a largo plazo
Hepatopatía crónica y esteatosis hepática	C	Dieta hepática, control de peso, nutracéuticos	Reducción de ALT y mejor ecogenicidad hepática en 8–16 semanas
Hepatopatía por corticoides	C	Dosis mínima eficaz del corticoide, nutracéuticos	Menor acumulación lipídica hepática, control de enzimas cada 3 meses
Paciente geriátrico con comorbilidad *(artrosis, ERC, cardiopatía)*	C	Protocolo de cada patología, revisión geriátrica cada 6 meses	Mejora de la movilidad en 6–8 semanas y apoyo renal y cardíaco continuo

***Nivel de evidencia**: **A** ensayos controlados en perros o gatos. **B** estudios caninos o felinos observacionales o mecanísticos. **C** extrapolación o consenso.
****Los tratamientos citados en «Contexto clínico habitual» reflejan el estándar de práctica descrito en la bibliografía y quedan siempre a criterio del veterinario.

¿Qué hace único a Omega 3 Vital? El único omega-3 veterinario con EPA y DHA en la proporción de los ensayos clínicos en artrosis, riñón y corazón (1,5:1), sin omega-6 añadido y con astaxantina natural, el antioxidante más potente, cerca de la dosis clínica de 0,3 mg/kg. Polvo microencapsulado que protege el aceite de la oxidación hasta servirlo. Un solo producto para el paciente geriátrico, en pocos gramos por cacito: sin heces blandas ni calorías de más.



Omega 3 *Neuro*

POLVO MICROENCAPSULADO

¿Qué perros se benefician de un Omega-3 rico en DHA + fosfatidilserina?

INDICACIÓN	*	CONTEXTO CLÍNICO HABITUAL**	QUÉ ESPERAR Y CUÁNDO, SEGÚN LOS ESTUDIOS*
Cachorros y perros jóvenes en aprendizaje o adiestramiento	A	Adiestramiento en positivo, socialización, dieta completa de crecimiento	Mejor capacidad de aprendizaje y retención, a partir de las 6–8 semanas
Disfunción cognitiva canina incipiente o leve	A	Enriquecimiento ambiental, rutinas estables, ejercicio y estimulación mental diaria	Mejor atención e interacción a las 6–8 semanas, máximo a las 8–12
Disfunción cognitiva moderada o grave	C	Selegilina o propentofilina según pauta, enriquecimiento ambiental, rutinas	Mejor control basal a las 8–12 semanas
Alteración del ciclo sueño-vigilia	B	Luz nocturna, rutinas fijas, melatonina, trazodona o gabapentina si precisa	Noches más tranquilas a partir de la semana 4–6
Ansiedad o cambios de conducta de inicio tardío	C	Modificación de conducta, feromonas (DAP), fluoxetina si indicada, nutracéuticos	Mayor calma y menor reactividad desde la semana 6–8
Recuperación tras anestesia o cirugía en el perro geriátrico	C	Analgesia adecuada, retorno rápido a rutinas, evitar hospitalización prolongada	Menor desorientación postoperatoria. Iniciar idealmente 4 semanas antes
Prevención en perros de edad media	C	Enriquecimiento ambiental, control de peso, revisión geriátrica anual	Mantenimiento de la función cognitiva. Mejor cuanto antes se inicie

***Nivel de evidencia**: **A** ensayos controlados en perros o gatos. **B** estudios caninos o felinos observacionales o mecanísticos. **C** extrapolación o consenso.
****Los tratamientos citados en «Contexto clínico habitual» reflejan el estándar de práctica descrito en la bibliografía y quedan siempre a criterio del veterinario.

¿Qué hace único a Omega 3 Neuro? El único omega-3 veterinario con DHA dominante en la proporción de los estudios en cognición canina (DHA:EPA 2,5:1) y fosfatidilserina, el fosfolípido de la membrana neuronal, a la dosis de los ensayos en perros senior. Polvo microencapsulado que protege el aceite de la oxidación hasta servirlo. Apoyo cognitivo completo en pocos gramos por cacito: sin heces blandas ni calorías de más.

Omega 3 *Derma*

POLVO MICROENCAPSULADO



¿Qué perros se benefician de un Omega-3 rico en EPA + DHA + GLA?

INDICACIÓN	*	CONTEXTO CLÍNICO HABITUAL**	QUÉ ESPERAR Y CUÁNDO, SEGÚN LOS ESTUDIOS*
Dermatitis atópica leve *(sin tratamiento sistémico)*	A	Baño semanal (emoliente o clorhexidina según citología), hidrocortisona aceponato tópica, isoxazolina, control ambiental, nutracéuticos	Menos rascado en semanas 3–4, menos picor y menos lesiones cutáneas en semanas 6–10, máximo a las 12
Dermatitis atópica moderada o grave en tratamiento sistémico	A	Fármaco a dosis de inducción, baños, isoxazolina, inmunoterapia si indicada	Mejor control basal a las 6–8 semanas
Prurito estacional, inicio anticipado	A	Limpieza de patas tras el paseo, baños frecuentes, isoxazolina, nutracéuticos	Iniciar 6–8 semanas antes de la temporada. Brote más leve
Pelaje apagado, quebradizo o muda excesiva	A	Revisar dieta base, cepillado, descartar endocrinopatía, nutracéuticos	Pelaje más suave a las 3–4 semanas, con más brillo y densidad a las 6–8
Pioderma superficial	B	Clorhexidina tópica, antibiótico solo con citología o cultivo	No trata la infección activa. Menos recidivas desde los 2–3 meses
Dermatitis por Malassezia	B	Antifúngico según citología, clorhexidina	No trata la infección activa. Menos recidivas desde los 2–3 meses
Seborrea y descamación	B	Champú queratomodulador, emolientes, nutracéuticos	Menos descamación y mejor textura en semanas 4–6, máximo a las 8–12
Piel seca y con caspa	B	Hidratante con ceramidas, spot-on de ácidos grasos, evitar champús agresivos	Piel menos seca y menos caspa en 4–6 semanas
Otitis externa alérgica recurrente	C	Limpieza ótica, tópico según citología, control de la atopia	Menos episodios al año, valorable desde los 3 meses
Inmunoterapia alérgeno-específica *(ASIT)*	C	Inmunoterapia, rescate farmacológico durante la inducción, baños, nutracéuticos	Menor prurito basal durante los 6–12 meses de inducción
Dermatitis alérgica a la picadura de pulga	C	Isoxazolina en animal y convivientes, tratamiento ambiental	Menor inflamación residual desde la semana 4–6
Adenitis sebácea	C	Ciclosporina, baños de aceite, nutracéuticos	Coadyuvante del rebrote desde las 6–8 semanas
Hipotiroidismo	C	Levotiroxina	Mejor calidad del pelo nuevo desde las 6–8 semanas
Hiperadrenocorticismo	C	Trilostano	Mejor calidad del pelo nuevo desde las 6–8 semanas
Prevención en razas predispuestas *(Westie, Bulldog, Carlino…)*	C	Higiene de barrera desde cachorro, isoxazolina, evitar sobrebaño, nutracéuticos	Mantenimiento de la barrera antes de la sensibilización

***Nivel de evidencia**: **A** ensayos controlados en perros o gatos. **B** estudios caninos o felinos observacionales o mecanísticos. **C** extrapolación o consenso.
****Los tratamientos citados en «Contexto clínico habitual» reflejan el estándar de práctica descrito en la bibliografía y quedan siempre a criterio del veterinario.

¿Qué hace único a Omega 3 Derma? Es el único omega-3 veterinario que combina EPA, DHA y GLA en las mismas proporciones que los ensayos clínicos en dermatitis atópica canina (EPA:DHA 1,5:1, EPA:GLA 8:1), en polvo microencapsulado que protege el aceite de la oxidación hasta el momento de servirlo. Una dosis exacta por cacito, concentrada en pocos gramos: sin heces blandas y sin calorías innecesarias que engorden al perro.