N 500

Nanut® foal

Pienso complementario de lactancia para potros



CONTIENE CUCHARA DOSIFICADORA DE 15 g

Usos:

- Para acompañar o sustituir la leche materna en la alimentación del potro neonato (en caso de no disponibilidad, cantidad insuficiente o leche insalubre por parte de la yegua).
- Para incrementar el aporte energético en potros débiles.
- Para adelantar el destete.

En potros destetados Nanut puede ser administrado en polvo, mezclado con el alimento a razón de 100-1.000 g al día en función del peso y del estado nutricional del animal.

Propiedades:

Producto de elevada digestibilidad, formulado según los conceptos dietéticos más recientes. Moderado contenido de lactosa y proteínas para controlar la enteritis bacteriana. Elevado aporte de aminoácidos esenciales para un correcto crecimiento. Factores emulsionantes para facilitar la digestión de grasas. Sales rehidratantes para mejorar la hidratación del potro.

Componentes analiticos:

Proteína Bruta: 15.5%; Fibra Bruta: 0.3%; Aceites y Grasas Brutas: 9.3%; Cenizas: 7%; Sodio: 0.4%.

Aditivos por kg.

Vitaminas y provitaminas:

Vitamina A (E672):	20.000 UI	Pantotenato Calcico:	10,5 mg
Vitamina D_3 (E671):	2.000 UI	Ac. Fólico:	0,5 mg
Vitamina E:	150 mg	Vitamina C:	50 mg
Vitamina K:	5 mg	Colina:	150 mg
Vitamina B_1:	5 mg	Lisina:	15 g
Vitamina B_2:	3 mg	Metionina:	4,3 g
Vitamina B_6:	1,5 mg	Cistina:	1,7 g
Vitamnia B_{12}:	75 ug		

Composicion:

Leche desnatada en polvo, suero de leche en polvo, glucosa deshidratada, dextrosa, aceite de palma, harina de trigo, aceite de coco y aromas.

Lote:

Consumir preferentemente antes del:

Instrucciones de uso:

Administrar una vez tomado el calostro, desde el primer día de vida. En condiciones normales el potro neonato consume el equivalente al 20% de su peso. En caso de potros débiles, la necesidad energética se puede incluso duplicar, como ocurre en septicemias generalizadas, intervenciones quirúrgicas, stress térmico y diarreas. En estas ocasiones es preciso, además del aporte energético de Nanut, el soporte nutricional vía parenteral.

Las siguientes dosificaciones se refieren a potros con un peso al nacimiento alrededor de los 50 kg con un desarrollo normal en ausencia de patologías . Para necesidades superiores se puede incrementar la cantidad de leche y la frecuencia de tomas diarias.

Mezclar 1 parte de Nanut (100 g) por cada 9 partes de agua (900 g) a 60 ºC y administrar a una temperatura de 40 ºC. El primer día la cantidad puede variar en función de la cantidad de calostro tomada.

Edad potro	Nº de tomas diarias	Nanut (g) por toma	Leche (lt.) reconstituida por toma	Leche (lt.) reconstituida por día
Hasta 3 días	12	50	0,450	5,4
4º día	10	100	0,900	9,0
5º día	10	125	1,125	11,3
6º día	10	130	1,170	11,7
7º día	10	135	1,215	12,2
2ª semana	9	180	1,620	14,6
3ª semana	8	220	1,980	15,8
4-5ª semana	6	300	2,700	16,2
6-8ª semana	6	330	3,170	18,9

Advertencias

Asegurar el acceso fácil y permanente a agua limpia.
Eliminar la leche reconstituida sobrante después de cada toma.
Lavar bien los recipientes en el proceso.

Prohibida la administración simultánea de vitamina D2.

Fabricado:

ACME DRUGS s.r.l.

Nº Autoriz. αIT000009 RE

Distribuido por:

Fatro Ibérica S.L.
Constitución 1. P. B. 3
Sant Just Desvern. 08960
Barcelona. (ESPAÑA)

Nº Autoriz. αESP08200167