ANEXO I

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDICAMENTO

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

STARTVAC emulsión inyectable para bovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Una dosis (2 ml) contiene:

Principios activos:
Escherichia coli J5 inactivada > 50 RED_{60} *
Staphylococcus aureus (CP8) inactivada (cepa SP 140), expresando complejo antigénico asociado a exopolisacárido (SAAC) > 50 RED_{80} **
* RED_{60}: Dosis efectiva en conejos en el 60 % de los animales (serología).
** RED_{80}: Dosis efectiva en conejos en el 80 % de los animales (serología).

Adyuvantes:
Parafina líquida 18,2 mg

Excipientes:

Composición cualitativa de los excipientes y otros componentes	**Composición cuantitativa, si dicha información es esencial para una correcta administración del medicamento veterinario**
Alcohol bencílico	21 mg
Sorbitán, oleato de	
Polisorbato 80	
Alginato de sodio	
Cloruro de calcio dihidrato	
Simeticona	
Agua para preparaciones inyectables	

Emulsión homogénea de color marfil.

3. INFORMACIÓN CLÍNICA

3.1 Especies de destino

Bovino (vacas y novillas).

3.2 Indicaciones de uso para cada una de las especies de destino

Para la inmunización de rebaño de vacas y novillas sanas, en rebaño de vacas lecheras con problemas de mastitis recurrentes, para reducir la incidencia de mastitis subclínica y la incidencia y gravedad de los signos clínicos de la mastitis clínica causada por *Staphylococcus aureus*, coliformes y estafilococos coagulasa negativos.

Establecimiento de la inmunidad: aproximadamente desde el día 13 después de la primera inyección.

Duración de la inmunidad: hasta aproximadamente el día 78 después de la tercera inyección.

3.3 Contraindicaciones

Ninguna.

3.4 Advertencias especiales

Todo el rebaño debe ser inmunizado.

La inmunización debe ser considerada como un componente en un programa complejo de control de la mastitis que trate todos los factores sanitarios importantes de las ubres (por ejemplo, técnica de ordeño, manejo de reproducción y secado, higiene, nutrición, alojamiento, yacija, confort de la vaca, calidad del aire y del agua, control de la salud) y otras prácticas de manejo.

Vacunar únicamente animales sanos.

3.5 Precauciones especiales de uso

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

No procede.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Al usuario:
Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo.

Al facultativo:
Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento veterinario puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón.

Precauciones especiales para la protección del medio ambiente:

No procede.

3.6 Acontecimientos adversos

Bovino (vacas y novillas):

Muy frecuentes (> 1 animal por cada 10 animales tratados):	Hinchazón en la zona de inyección[1] Dolor en la zona de inyección[2]

Muy raros (< 1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):	Temperatura elevada[3] Reacción de tipo anafiláctico[4]

[1] Pueden producirse reacciones transitorias locales leves o moderadas (hasta 8 cm de diámetro) después de la administración de una dosis, que desaparecen como máximo en una o dos semanas.
[2] Reacciones locales transitorias de leves a moderadas que remiten espontáneamente en un máximo de 4 días.
[3] Puede observarse un incremento medio transitorio de la temperatura corporal de aproximadamente 1 ºC, en algunas vacas hasta 2 ºC, durante las primeras 24 horas después de la inyección.
[4] En algunos animales sensibles pueden producirse reacciones adversas que pueden poner en peligro la vida. En estas circunstancias, debe administrarse un tratamiento sintomático rápido y adecuado.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Las notificaciones se enviarán, preferiblemente, a través de un veterinario al titular de la autorización de comercialización o a su representante local o a la autoridad nacional competente a través del sistema nacional de notificación. Consulte los datos de contacto respectivos en el prospecto.

3.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

Gestación y lactancia:
Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

3.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

3.9 Posología y vías de administración

Vía intramuscular.

Es preferible que las inyecciones se administren alternando los lados del cuello. Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre 15 ºC y 25 ºC antes de su administración. Agitar antes de usar.

Si las enfermedades en el rebaño se presentan principalmente sólo al inicio de la lactancia:

Administrar una dosis (2 ml) por inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello 45 días antes de la fecha de parto esperada y 1 mes después, administrar una segunda dosis (al menos 10 días antes del parto). Una tercera dosis debe de ser administrada 2 meses más tarde.

El programa de inmunización completo debe repetirse en cada gestación.

Si la enfermedad se presenta en todo el rebaño durante todo el período de lactancia (vacunación continua):

Administrar una dosis (2 ml) por inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello y 1 mes después, administrar una segunda dosis. Una tercera dosis debe de ser administrada 2-3 meses más tarde y nuevos refuerzos a más tardar 3 meses.

3.10 Síntomas de sobredosificación (y, en su caso, procedimientos de urgencia y antídotos)

No se observaron reacciones adversas aparte de las mencionadas en la sección 3.6 después de la administración de una dosis doble de vacuna.

3.11 Restricciones y condiciones especiales de uso, incluidas las restricciones del uso de medicamentos veterinarios antimicrobianos y antiparasitarios, con el fin de reducir el riesgo de desarrollo de resistencias

No procede.

3.12 Tiempos de espera

Cero días.

4. INFORMACIÓN INMUNOLOGICA

4.1 Código ATCvet: QI02AB17.

Para estimular la inmunidad activa frente a *Staphylococcus aureus*, coliformes y estafilococos coagulasa negativos.

5. DATOS FARMACÉUTICOS

5.1 Incompatibilidades principales

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario.

5.2 Periodo de validez

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 18 meses.
Período de validez después de abierto el envase primario: 10 horas conservado entre 15 ºC y 25 ºC.

5.3 Precauciones especiales de conservación

Conservar y transportar refrigerado (entre 2 ºC y 8 ºC).
Proteger de la luz.
No congelar.

5.4 Naturaleza y composición del envase primario

Viales de vidrio incoloro de tipo I de 3, 10 y 50 ml.
Viales de polietileno (PET) de 10, 50 y 250 ml.
Los viales son cerrados con tapones de goma y cápsulas de aluminio.

Formatos:
- Caja de cartón con 1 vial de vidrio de 1 dosis.
- Caja de cartón con 10 viales de vidrio de 1 dosis.
- Caja de cartón con 20 viales de vidrio de 1 dosis.
- Caja de cartón con 1 vial de vidrio de 5 dosis.
- Caja de cartón con 10 viales de vidrio de 5 dosis.
- Caja de cartón con 1 vial de vidrio de 25 dosis
- Caja de cartón con 10 viales de vidrio de 25 dosis
- Caja de cartón con 1 vial PET de 5 dosis.
- Caja de cartón con 1 vial PET de 25 dosis.
- Caja de cartón con 1 vial PET de 125 dosis.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

5.5 Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables al medicamento veterinario en cuestión.

6. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

7. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

EU/2/08/092/001-010

8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN

Fecha de la primera autorización: 11/02/2009

9. FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DEL RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDICAMENTO

{DD/MM/AAAA}

10. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

ANEXO II

OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Ninguna

ANEXO III

ETIQUETADO Y PROSPECTO

A. ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Cajas de cartón, vial PET (250 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

STARTVAC emulsión inyectable para bovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Una dosis (2 ml) contiene:
E. coli J5 inactivada > 50 RED_{50} (Dosis efectiva en conejos en el 60 % de los animales (serología)).
S. aureus (CP8) inactivada (cepa SP140), expresando complejo antigénico asociado a exopolisacárido (SAAC) > 50 RED_{80} (En el 80 % de los animales).
Parafina líquida: 18,2 mg
Alcohol bencílico: 21 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 vial de 1 dosis (2 ml)
10 viales de 1 dosis (2 ml)
20 viales de 1 dosis (2 ml)
1 vial de 5 dosis (10 ml)
10 viales de 5 dosis (10 ml)
1 vial de 25 dosis (50 ml)
10 viales de 25 dosis (50 ml)
1 vial de 125 dosis (250 ml)
125 dosis (250 ml)

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas y novillas).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, utilizar antes de un periodo de 10 horas, conservado entre 15 ºC y 25 ºC.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
Proteger de la luz.
No congelar.

10. LA ADVERTENCIA "LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR"

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

EU/2/08/092/001 1 vial de vidrio de 1 dosis
EU/2/08/092/002 10 viales de vidrio de 1 dosis
EU/2/08/092/003 20 viales de vidrio de 1 dosis
EU/2/08/092/004 1 vial de vidrio de 5 dosis
EU/2/08/092/005 10 viales de vidrio de 5 dosis
EU/2/08/092/006 1 vial de vidrio de 25 dosis
EU/2/08/092/007 10 viales de vidrio de 25 dosis
EU/2/08/092/008 1 vial PET de 5 dosis
EU/2/08/092/009 1 vial PET de 25 dosis
EU/2/08/092/010 1 vial PET de 125 dosis

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Viales PET (10 ml, 50 ml) y viales de vidrio (2 ml, 10 ml, 50 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

STARTVAC

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Una dosis contiene:
E. coli J5 inactivado; *S. aureus* (CP8) inactivada (cepa SP140).

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, utilizar antes de un periodo de 10 horas, conservado entre 15 ºC y 25 ºC.

5. TAMAÑO DEL ENVASE

1 dosis (2 ml)
5 dosis (10 ml)
25 dosis (50 ml)

B. PROSPECTO

PROSPECTO

1. Denominación del medicamento veterinario

STARTVAC emulsión inyectable para bovino.

2. Composición

Una dosis (2 ml) contiene:
Escherichia coli (J5) inactivada > 50 RED_{60} *
Staphylococcus aureus (CP8) inactivada (cepa SP 140), expresando complejo antigénico asociado a exopolisacárido (SAAC) > 50 RED_{80} **
* RED_{60}: Dosis efectiva en conejos en el 60 % de los animales (serología).
** RED_{80}: Dosis efectiva en conejos en el 80 % de los animales (serología).

Parafina líquida: 18,2 mg
Alcohol bencílico: 21 mg

Emulsión homogénea de color marfil.

3. Especies de destino

Bovino (vacas y novillas).

4. Indicaciones de uso

Para la inmunización de rebaños de vacas y novillas sanas, en rebaños de vacas lecheras con problemas de mastitis recurrentes, para reducir la incidencia de mastitis subclínica y la incidencia y gravedad de los signos clínicos de la mastitis clínica causada por *Staphylococcus aureus*, coliformes y estafilococos coagulasa negativos.

Establecimiento de la inmunidad: aproximadamente desde el día 13 después de la primera inyección.

Duración de la inmunidad: hasta aproximadamente el día 78 después de la tercera inyección.

5. Contraindicaciones

Ninguna.

6. Advertencias especiales

Advertencias especiales:
Todo el rebaño debe ser inmunizado.

La inmunización debe ser considerada como un componente en un programa complejo de control de la mastitis que trate todos los factores sanitarios importantes de las ubres (por ejemplo, técnica de ordeño, manejo de reproducción y secado, higiene, nutrición, alojamiento, yacija, confort de la vaca, calidad del aire y del agua, control de la salud) y otras prácticas de manejo.

Vacunar únicamente animales sanos.

Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:
No procede.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Al usuario:
Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario, busque urgentemente con un médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo.

Al facultativo:
Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento veterinario puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón.

Gestación y lactancia:
Puede administrarse durante la gestación y la lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

Sobredosificación:
No se observaron reacciones adversas aparte de las mencionadas en la sección “Acontecimientos adversos” después de la administración de una dosis doble de vacuna.

Incompatibilidades principales:
No mezclar con ningún otro medicamento veterinario.

7. Acontecimientos adversos

Bovino (vacas y novillas):

Muy frecuentes (> 1 animal por cada 10 animales tratados):
Hinchazón en la zona de inyección[1], Dolor en la zona de inyección[2]
Muy raros (< 1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados):
Temperatura elevada[3] Reacción de tipo anafiláctico (reacción alérgica grave)[4]

[1] Pueden producirse reacciones transitorias locales leves o moderadas (hasta 8 cm de diámetro) después de la administración de una dosis, que desaparecen como máximo en una o dos semanas.
[2] Reacciones locales transitorias de leves a moderadas que remiten espontáneamente en un máximo de 4 días.

[3] Puede observarse un incremento medio transitorio de la temperatura corporal de aproximadamente 1 ºC, en algunas vacas hasta 2 ºC, durante las primeras 24 horas después de la inyección.
[4] En algunos animales sensibles pueden producirse reacciones adversas que pueden poner en peligro la vida. En estas circunstancias, debe administrarse un tratamiento sintomático rápido y adecuado.

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización o a su representante local utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación: {descripción del sistema nacional de notificación}

8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Vía intramuscular. Es preferible que las inyecciones se administren alternando los lados del cuello.

Si las enfermedades en el rebaño se presentan principalmente sólo al inicio de la lactancia:

Administrar una dosis (2 ml) por inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello 45 días antes de la fecha de parto esperada y 1 mes después, administrar una segunda dosis (al menos 10 días antes del parto). Una tercera dosis debe de ser administrada 2 meses más tarde.

El programa de inmunización completo debe repetirse en cada gestación.

Si la enfermedad se presenta en todo el rebaño durante todo el período de lactancia (vacunación continua):

Administrar una dosis (2 ml) por inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello y 1 mes después, administrar una segunda dosis. Una tercera dosis debe de ser administrada 2-3 meses más tarde y nuevos refuerzos a más tardar 3 meses.

9. Instrucciones para una correcta administración

Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre 15 ºC y 25 ºC antes de su administración. Agitar antes de usar.

10. Tiempos de espera

Cero días.

11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C).
Proteger de la luz.
No congelar.
No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja de cartón y en la etiqueta después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.
Periodo de validez después de abierto el envase primario: 10 horas conservado entre 15 ºC y 25 ºC.

12. Precauciones especiales para la eliminación

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

13. Clasificación de los medicamentos veterinarios

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. Números de autorización de comercialización y formatos

Números de autorización de comercialización: EU/2/08/092/001-010

Formatos:
- Caja de cartón con 1, 10 o 20 viales de vidrio de 1 dosis.
- Caja de cartón con 1 o 10 viales de vidrio de 5 dosis.
- Caja de cartón con 1 o 10 viales de vidrio de 25 dosis.
- Caja de cartón con 1 vial PET de 5 dosis.
- Caja de cartón con 1 vial PET de 25 dosis.
- Caja de cartón con 1 vial PET de 125 dosis.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

15. Fecha de la última revisión del prospecto

{DD/MM/AAAA}

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Datos de contacto

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 AMER (Girona) SPAIN
TEL: +34 972 43 06 60

Representantes locales y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

België/Belgique/Belgien
HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIË
Tel: +32 09 2964464

Република България
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ИСПАНИЯ
Тел: +34 972 43 06 60

Česká republika
HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Zochova 5,
811 03 Bratislava,
SLOVENSKO
Tel: +421 02 32 335 223

Danmark
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIEN
Tel: +34 972 43 06 60

Deutschland
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Am Wehrhahn 28-30
40211 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel: +49 211 698236 – 0

Eesti
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
HISPAANIA
Tel: +34 972 43 06 60

Ελλάδα
HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 80 & Μηριόνου 2-4,
104 41 Κολωνός - ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ
Τηλ: +30 210 4978660

España
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ESPAÑA
Tel: +34 972 43 06 60

Lietuva
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ISPANIJA
Tel: +34 972 43 06 60

Luxembourg/Luxemburg
HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIQUE
Tel: +32 09 2964464

Magyarország
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANYOLORSZÁG
Tel: +34 972 43 06 60

Malta
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANJA
Tel: +34 972 43 06 60

Nederland
HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIË
Tel: +32 09 2964464

Norge
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIA
Tlf: +34 972 43 06 60

Österreich
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Am Wehrhahn 28-30
40211 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel: +49 211 698236 – 0

Polska
HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.
Ul. Wincentego Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa - POLSKA
Tel: +48 22 642 33 06

France
HIPRA FRANCE
7 rue Roland Garros, Batiment H
44700 - Orvault -
FRANCE
Tél: +33 02 51 80 77 91

Hrvatska
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANJOLSKA
Tel: +34 972 43 06 60

Ireland
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Tel: +34 972 43 06 60

Ísland
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPÁNN
Sími: +34 972 43 06 60

Italia
Hipra Italia S.r.l.
Enrico Mattei, 2
25030 Coccaglio (BS)
ITALIA
Tel: +39 030 7241821

Κύπρος
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλ: +34 972 43 06 60

Latvija
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPĀNIJA
Tel. +34 972 43 06 60

Portugal
HIPRA ANIMAL HEALTH PORTUGAL, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA
Portela de Mafra, Abrunheira
2665 – 191 Malveira - PORTUGAL
Tel:+351 219 663 450

România
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIA
Tel: +34 972 43 06 60

Slovenija
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANIJA
Tel: +34 972 43 06 60

Slovenská republika
HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Zochova 5,
811 03 Bratislava,
SLOVENSKO
Tel: +421 02 32 335 223

Suomi/Finland
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ESPANJA
Puh/Tel: +34 972 43 06 60

Sverige
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIEN
Tel. +34 972 43 06 60

United Kingdom (Northern Ireland)
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Tel: +34 972 43 06 6