Feluro

SUSPENSIÓN ORAL PALATABLE PARA PERROS Y GATOS
ALIMENTO COMPLEMENTARIO. AYUDA A MANTENER LA SALUD DEL TRACTO URINARIO

DESCRIPCIÓN:
FELURO ayuda a mantener la salud del tracto urinario.
FELURO es una suspensión altamente palatable y se basa en la asociación de 3 ingredientes: N-Acetyl-D-Glucosamina, concentrado acuoso de flores de hibisco y concentrado seco de té verde, estos aportan 4 beneficios principales:

- Apoya el revestimiento del tracto urinario.
- Apoya la salud celular del tracto urinario en caso de estrés oxidativo.
- Ayuda a mantener la orina estéril en el tracto urinario.
- Ayuda a disminuir el estrés relacionado con acontecimientos externos.


COMPOSICIÓN:
Aceite vegetal refinado (Oliva y copra), N-acetil-D-Glucosamina (obtenida por fermentación) 6,28 %, derivados de origen vegetal, Gamma ciclodextrina, lecitina bruta, concentrado seco de té verde** (min. 1,88 %), mono oleato de glicerol, levaduras, maltodextrina, concentrado acuoso de flores de hibisco ** (min. 0,46%), azúcares, minerales.
*Fuente rica en L-Teanina/ **contiene polifenoles

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS:
Grasa bruta: 76,0%, proteína bruta: 4,5%, fibra bruta: < 2%, cenizas brutas: 1,7%, L-Teanina: 1,1%, Polifenoles: 0,30%

INSTRUCCIONES DE USO:
Agitar enérgicamente antes de cada uso.
La presencia de un ligero sedimento es normal. Administrar 1 ml dos veces al día, usando la jeringa dosificadora. El agua debe estar disponible en todo momento. No exceder la cantidad recomendada.

CONSERVACIÓN:
Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente, incluso después de abierto. El producto puede congelarse a bajas temperaturas, pero volverá a su aspecto inicial después de algunas horas a temperatura ambiente sin afectar a la calidad del producto. Una vez abierto usar antes de 2 meses.

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN *(ver dibujos adjuntos)*:
1: Agitar enérgicamente.
2: Desenroscar el tapón blanco.
3 & 4: Enroscar y abrir el tapón azul.
5: Insertar la jeringa.
6: Invertir la botella y llenar la jeringa.
7: Volver a poner la botella en posición vertical antes de retirar la jeringa.
8: Mezclar el producto con la comida o
8bis: opcionalmente también se puede administrar por la boca.
9: Cerrar la botella y aclarar la jeringa con agua.



Para más información, contactar con:
Virbac responde
933 716 373 616 764 990
virbac.responde@virbac.es