VETERINARY HPM GAMA DIETÉTICA

UROLOGY

Árbol de decisión para la elección de la dieta correcta

ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR FELINO (FLUTD)

CÁLCULOS/CRISTALES

ESTRUVITA

Corto plazo (5-12 semanas):
DISOLUCIÓN DIETÉTICA

Cálculos



1 STRUVITE DISSOLUTION
Struvite stones

Cristales



WET DISSOLUTION & PREVENTION
Struvite & Oxalate Crystals

2 DISSOLUTION & PREVENTION
Struvite & Oxalate Crystals

DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN

A largo plazo[1]:
PREVENCIÓN DIETÉTICA[1]

Prevención de la formación de estruvita y/o oxalato cálcico



2 DISSOLUTION & PREVENTION
Struvite & Oxalate Crystals



WET DISSOLUTION & PREVENTION
Struvite & Oxalate Crystals

OXALATO CÁLCICO

Cálculos o cristales

SIN DISOLUCIÓN DIETÉTICA

EXTRACCIÓN MEDIANTE CIRUGÍA

DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN

CISTITIS IDIOPÁTICA FELINA (CIF)
(con o sin cristales)

TRATAMIENTO DIETÉTICO
a largo plazo[1]



3 URINARY WIB
Water Intake & Behaviour



WET DISSOLUTION & PREVENTION
Struvite & Oxalate Crystals

1. Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo.

VETERINARY HPM GAMA DIETÉTICA

UROLOGY

1 STRUVITE DISSOLUTION
Struvite stones



TAMAÑOS DISPONIBLES
1,5 kg · 3 kg

INDICACIONES DIETÉTICAS*

- Disolución de cálculos de estruvita (entre 5 y 12 semanas).

OTROS USOS

- Reducción de la formación de cálculos de oxalato.

CONTRAINDICACIONES

- Crecimiento.
- Gestación y lactación.
- Insuficiencia renal crónica (IRC).
- Insuficiencia cardiaca.

**Directiva de la Comisión 2020/354.*

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (% como alimento)

Humedad	5,5
Proteína	44
Ratio proteína animal/vegetal	90/10
Materia grasa bruta	16
Minerales	7,5
Fibra bruta	4
ELN*	23
Almidón	15
Calcio	0,65
Fósforo	0,65
Sodio	1,3
Potasio	0,7
Magnesio	0,08
Cloruro	1,8
Azufre	0,7
Metionina + cistina	1,5
Ácidos grasos Omega-6	2,5
Ácidos grasos Omega-3	1
EPA + DHA	0,3

VALORES NUTRICIONALES CLAVE

EM** calculada (kcal/100 g)***	397
EM** medida *in vivo* (kcal/100 g)	385
Digestibilidad proteína (*in vivo*, %)	87
Digestibilidad grasa (*in vivo*, %)	96
Energía de la proteína (%)	42
Energía de la grasa (%)	37
Energía de ELN* (%)	21
Ratio proteína/calorías (g/Mcal)	111

* Extracto libre de nitrógeno.
** Energía metabolizable.
*** Calculada con NRC 2006.

BAJO EN HIDRATOS DE CARBONO (ELN) 23%

RICO EN PROTEÍNA 44%

de ORIGEN ANIMAL 90%

COMPOSICIÓN

Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, almidón de patata, proteínas de cerdo y de aves hidrolizadas, grasas animales ,minerales, guisantes, vainas de haba, arroz, pulpa de remolacha, linaza, levadura de cerveza, aceite de pescado, lignocelulosa, fibra de *psyllium* (*Plantago (L.) spp.*), fructooligosacáridos, crustáceos hidrolizados (fuente de quitosán), condroitín sulfato, *Lactobacillus acidophilus*.

INGREDIENTES ESPECÍFICOS ADITIVOS

Bentonita	5 g/kg
Lactobacillus acidophilus	7 mg/kg
Quitosán	800 mg/kg
L-carnitina	540 mg/kg
Citrato de potasio	0,3 %

MODO DE EMPLEO

Peso corporal (kg)	Ración diaria (g/día)		
	Sobrepeso	Normal*	Peso bajo
2	20	20	25
3	30	35	35
4	40	45	50
5	50	55	60
6	60	65	75
7	70	75	85
8	75	85	95
9	85	100	110
10	95	110	120

La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del gato, y debe ajustarse cada mes.

*Gato adulto esterilizado de interior con peso corporal óptimo.