

TAMAÑOS DISPONIBLES
1,5 kg · 3 kg · 7 kg

INDICACIONES DIETÉTICAS*

- Disolución de cálculos de estruvita.
- Reducción de la reaparición de cálculos de estruvita.
- Reducción de la formación de cálculos de oxalato.

CONTRAINDICACIONES

- Crecimiento.
- Gestación y lactación.
- Insuficiencia renal crónica (IRC).
- Insuficiencia cardiaca.

**Directiva de la Comisión 2020/354.*

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS

(% como alimento)	
Humedad	5,5
Proteína	44
Ratio proteína animal/vegetal	90/10
Materia grasa bruta	13,5
Minerales	7,5
Fibra bruta	6,5
ELN*	23
Almidón	15
Calcio	0,7
Fósforo	0,7
Sodio	1,1
Potasio	0,7
Magnesio	0,08
Cloruro	1,4
Azufre	0,7
Metionina + cistina	1,5
Ácidos grasos Omega-6	2,2
Ácidos grasos Omega-3	0,7

VALORES NUTRICIONALES CLAVE

EM** calculada (kcal/100 g)***	374
EM** medida *in vivo* (kcal/100 g)	364
Digestibilidad proteína (*in vivo*, %)	86
Digestibilidad grasa (*in vivo*, %)	91,5
Energía de la proteína (%)	44
Energía de la grasa (%)	33
Energía de ELN* (%)	23
Ratio proteína/calorías (g/Mcal)	118

* Extracto libre de nitrógeno.
** Energía metabolizable.
*** Calculada con NRC 2006.

BAJO EN HIDRATOS DE CARBONO (ELN) 23%

RICO EN PROTEÍNA 44%
de ORIGEN ANIMAL 90%

COMPOSICIÓN

Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, almidón de patata, proteínas de cerdo y de aves hidrolizadas, grasas animales ,minerales, vainas de haba, guisantes, lignocelulosa, arroz, pulpa de remolacha, linaza, levadura de cerveza, fibra de *psyllium* (*Plantago (L.) spp.*), fructooligosacáridos, crustáceos hidrolizados (fuente de quitosán), condroitín sulfato, *Lactobacillus acidophilus*.

INGREDIENTES ESPECÍFICOS ADITIVOS

Bentonita	5 g/kg
Lactobacillus acidophilus	7 mg/kg
Quitosán	800 mg/kg
L-carnitina	540 mg/kg
Citrato de potasio	0,3 %

MODO DE EMPLEO

Peso corporal (kg)	Ración diaria (g/día)		
	Sobrepeso Pérdida de peso suave	Normal*	Peso bajo
2	20	25	25
3	30	35	40
4	40	45	50
5	50	60	65
6	60	70	75
7	70	80	90
8	80	90	105
9	90	105	115
10	105	115	130

La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del gato, y debe ajustarse cada mes.

*Gato adulto esterilizado de interior con peso corporal óptimo.

VETERINARY HPM GAMA DIETÉTICA

UROLOGY 2 DISSOLUTION & PREVENTION
Struvite & Oxalate Crystals

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

> Aumento del consumo de agua
La cantidad elevada de proteína y sodio estimula el consumo de agua, incrementa el volumen de orina y la frecuencia de micción.

> Bajo RSS para estruvita (<1)
El perfil nutricional induce una orina insaturada para estruvitas, con una RSS para estruvita** <1, para fomentar la disolución de cálculos de estruvita existentes y prevenir su reaparición (eficacia demostrada por Virbac).(1)

> Optimiza el pH urinario*
Un pH urinario entre 6,0 y 6,5 permite prevenir la formación de cristales de estruvita y de oxalato (eficacia demostrada por Virbac).(1)

> Quelante de fósforo
La adición de quitosán, un quelante de fósforo, ayuda a reducir la biodisponibilidad del fósforo y su excreción urinaria. (eficacia probada por Virbac.(2)

> Control del peso corporal
La densidad energética moderada de la dieta y las raciones diarias adaptadas ayudan a mantener un peso corporal óptimo.

> Baja concentración de minerales*
El bajo contenido de calcio, fósforo y magnesio ayuda a limitar su excreción urinaria y el riesgo de formación de estruvita y oxalato.

> Adición de un inhibidor de oxalato
El citrato de potasio añadido, un inhibidor específico, ayuda a limitar la formación de cristales de oxalato cálcico.

> RSS para oxalato <12
El perfil nutricional induce una orina metaestable para oxalatos cálcicos, con una RSS para oxalatos <12 (eficacia probada por Virbac).(1)

> Elevada palatabilidad
La riqueza en proteína y grasa de origen animal garantiza una elevada palatabilidad y asegura un cumplimiento máximo a largo plazo.

20,5 DÍAS — TIEMPO MEDIO DE CURACIÓN
***Desaparición de todos los signos clínicos y ecográficos urinarios. Ausencia de cristales en el análisis de la orina*(1)**

14% DE REDUCCIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD APARENTE DEL FÓSFORO MEDIANTE LA ADICIÓN DE QUITOSÁN (3)

** Directiva de la Comisión 2020/354.*
1) D. Formankova et al. Iben C. Effect of new high protein – low carbohydrate diets on urinary parameters in cats and in vitro struvite dissolution. ESVCN Congress, Toulouse, France, 17-19 Sept 2015.
2) I. Leriche et al. Effect of chitosan supplementation in a dry maintenance diet on phosphorus apparent digestibility in cats. SEVC Congress, Barcelona, Spain, 15-17 Oct 2015.
3) I. Leriche et al. Effect of chitosan supplementation in a dry maintenance diet on phosphorus apparent digestibility in cats. SEVC Congress 2015.