VETERINARY HPM GAMA DIETÉTICA

DERMATOLOGY

Árbol de decisión para la elección de la dieta correcta

ENFERMEDAD DE LA PIEL Y EL PELO EN GATOS

ENROJECIMIENTO / PICOR DE LA PIEL

Sospecha de intolerancia alimentaria

ENSAYO DE ELIMINACIÓN
6-8 semanas



o



1 HYPOALLERGY FOOD INTOLERANCE
With insect protein

2 HYPOALLERGY FOOD INTOLERANCE
With hydrolysed fish protein

MEJORÍA

Alergia / Intolerancia alimentaria confirmada

Largo plazo[1]
DIETA DE ELIMINACIÓN



o



1 HYPOALLERGY FOOD INTOLERANCE
With insect protein

2 HYPOALLERGY FOOD INTOLERANCE
With hydrolysed fish protein

SIN MEJORÍA

2do ENSAYO DE ELIMINACIÓN
6-8 semanas



o



1 ALLERGY FOOD INTOLERANCE
With Insect protein

2 ALLERGY FOOD INTOLERANCE
With hydrolyzed fish protein

SIN MEJORÍA

Atopia no inducida por la alimentación/ alergia a la picadura de pulga/ otras alergias

Medio / Largo plazo[2]
REFUERZO DE LA PIEL Y EL PELAJE

PIEL GRASA / DESCAMADA



1. Si desaparecen los signos de intolerancia, este alimento puede utilizarse indefinidamente (Directiva de la Comisión 2020/354).
2. Hasta 2 meses. Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo (Directiva de la Comisión 2020/354).

NUTRITION FOR CARNIVORES · VETERINARY GLOBAL CARE

VETERINARY HPM GAMA DIETÉTICA

DERMATOLOGY 1 DERMATOLOGY SUPPORT

Dermatosis & Hair loss



TAMAÑOS DISPONIBLES
3 kg

INDICACIONES DIETÉTICAS*
- Refuerzo de la función dérmica en caso de dermatosis y pérdida excesiva de pelo.

OTROS USOS
- Dermatitis.
- Prurito.

CONTRAINDICACIONES
- Insuficiencia renal crónica (IRC).
- Insuficiencia hepática crónica.

**Directiva de la Comisión 2020/354.*

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (% como alimento)

Humedad	5,5
Proteína	44
Ratio proteína animal/vegetal	91/09
Materia grasa bruta	17,5
Minerales	8,5
Fibra bruta	5
ELN*	19,5
Almidón	14
Fósforo	1,1
Calcio	1,3
Sodio	0,7
Metionina + cistina	1,5
Fenilalanina + tirosina	2,6
Ácidos grasos Omega-6	3,5
AL	3,4
Ácidos grasos Omega-3	1,1
EPA + DHA	0,8

VALORES NUTRICIONALES CLAVE

EM** (kcal/100 g)***	395
EM** medida *in vivo* (kcal/100 g)	437
Digestibilidad proteína (*in vivo*, %)	89
Digestibilidad grasa (*in vivo*, %)	97
Energía de la proteína (%)	42
Energía de la grasa (%)	40
Energía de ELN* (%)	18
Ratio proteína/calorías (g/Mcal)	111

* Extracto libre de nitrógeno.
** Energía metabolizable.
*** Calculada con NRC 2006.

BAJO EN HIDRATOS DE CARBONO (ELN) 19,5%

RICO EN PROTEÍNA 44%
de ORIGEN ANIMAL 91%

COMPOSICIÓN
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, almidón de patata, guisantes, proteínas de cerdo y de aves hidrolizadas, minerales, lignocelulosa, grasas animales, aceite de pescado, pulpa de remolacha, aceite de girasol, levadura de cerveza, semillas de borraja, fibra de *psyllium* (*Plantago (L.) spp.*), fructooligosacáridos, crustáceos hidrolizados (fuente de quitosán), condroitín sulfato, *Lactobacillus acidophilus*.

INGREDIENTES ESPECÍFICOS ADITIVOS

Bentonita	5 g/kg
Lactobacillus acidophilus	7 mg/kg
Quitosán	800 mg/kg
L-carnitina	540 mg/kg

MODO DE EMPLEO

Peso corporal (kg)	Ración diaria (g/día)		
	Sobrepeso	Normal*	Peso bajo
2	20	20	25
3	30	35	35
4	40	45	50
5	50	55	60
6	60	65	75
7	70	75	85
8	80	85	95
9	85	100	110
10	95	110	120

La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del gato, y debe ajustarse cada mes. Tener siempre agua fresca al alcance del animal.

UTILIZACIÓN A LARGO PLAZO: Debido a su elevada densidad de energía, es necesario respetar las raciones diarias recomendadas para evitar una ganancia excesiva de peso.

*Gato adulto esterilizado de interior con peso corporal óptimo.