

TAMAÑOS DISPONIBLES
1,5 kg · 3 kg

INDICACIONES DIETÉTICAS
- Ayuda a la función renal en caso de insuficiencia renal crónica.
- Ayuda al metabolismo articular en caso de osteoartritis.

OTROS USOS
- Trastornos hepáticos crónicos.

CONTRAINDICACIONES
- Crecimiento.
- Gestación y lactación.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (% como alimento)

Humedad	5,5
Proteína	30
Ratio proteína animal/vegetal	86/14
Materia grasa bruta	21
Minerales	7
Fibra bruta	3,5
ELN*	33
Almidón	28
Calcio	1
EPA	0,55
Fósforo	0,5
Sodio	0,4
Potasio	0,8
Ácidos grasos Omega-6	3,2
Ácidos grasos Omega-3	1,5
DHA	0,4

VALORES NUTRICIONALES CLAVE

EM** calculada (kcal/100 g)***	415
EM** medida *in vivo* (kcal/100 g)	410
Digestibilidad proteína (*in vivo*, %)	84
Digestibilidad grasa (*in vivo*, %)	92,5
Energía de la proteína (%)	26
Energía de la grasa (%)	45
Energía de ELN* (%)	29

* Extracto libre de nitrógeno.
** Energía metabolizable.
*** Calculada con NRC 2006.

BAJO EN HIDRATOS DE CARBONO (ELN) 33%

RICO EN PROTEÍNA 30%

de ORIGEN ANIMAL 86%

COMPOSICIÓN
Proteínas de cerdo deshidratadas, arroz, grasas animales, almidón de patata, guisantes, proteínas de cerdo y de aves hidrolizadas, minerales, aceite de pescado, pulpa de remolacha, lignocelulosa, levadura de cerveza, proteína de pescado hidrolizada, fructooligosacáridos, fibra de *psyllium (Plantago psyllium (L.) spp.)*, crustáceos hidrolizados (fuente de quitosán), membrana de cáscara de huevo, condroitín sulfato, *Lactobacillus acidophilus*.

INGREDIENTES ESPECÍFICOS ADITIVOS

Condroitín sulfato	1.200 mg/kg
Quitosán	1.200 mg/kg
Membrana cáscara huevo	1.200 mg/kg
Carbonato cálcico	1 %
Vitamina E	610 mg/kg
Lactobacillus acidophilus	7 mg/kg
Bentonita	5 g/kg
L-carnitina	540 mg

MODO DE EMPLEO

Peso corporal (kg)	Ración diaria (g/día)	
	Normal*	Peso bajo
2	20	25
3	30	35
4	40	50
5	50	60
6	60	70
7	70	85
8	80	100
9	90	110
10	100	120

La ración diaria se basa en el peso corporal ACTUAL del gato, y debe ajustarse cada mes.

Los animales deben tener siempre agua fresca a su alcance.

*Gato senior esterilizado de interior con peso corporal óptimo.

VETERINARY HPM GAMA DIETÉTICA
KIDNEY & JOINT
3 ADVANCED KIDNEY & JOINT

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

> **Limitado aporte proteico**
Reducción del 15 % del aporte proteico frente a la dieta para gatos Veterinary HPM Kidney & Joint. Este contenido y la alta calidad de las proteínas ayuda a limitar la producción de toxinas urémicas y a mantener la calidad de vida.

> **Aporte reducido de fósforo**
El contenido de fósforo es un 10 % más bajo que la dieta para gatos Veterinary HPM Kidney & Joint. Esta restricción ayuda a frenar la evolución de la insuficiencia renal y minimiza el riesgo de hiperparatiroidismo secundario.

> **Gran energía y alta concentración**
La alta densidad energética asegura raciones diarias pequeñas y concentradas que compensan la falta de apetito y ayudan contra la desnutrición.

> **Quelantes del fósforo**
La adición de quitosán y carbonato de calcio ayuda a reducir la biodisponibilidad del fósforo en la dieta.

> **Elevado aporte de omega-3 y DHA**
Fuentes de grasa específicas aportan altos niveles de ácidos grasos omega-3 (especialmente DHA) que ayudan a limitar los procesos inflamatorios y el dolor en las articulaciones.

> **Mobility Plus Complex**
La asociación de condroitín sulfato, quitosán y membrana de cáscara de huevo ayuda a mantener la integridad del cartílago.

> **Palatability Plus Complex**
La riqueza en ingredientes animales (46 %) y el uso de nuevos ingredientes garantizan una elevada palatabilidad para un óptimo cumplimiento.

> **Actividad antioxidante incrementada**
El elevado contenido de vitamina E ayuda a limitar los procesos oxidativos que podrían afectar tanto al metabolismo articular como la función renal.

> **Adecuada para gatos adultos y senior**
Las cantidades de todos los nutrientes esenciales se ajustan a los requisitos diarios de los gatos adultos y séniors.

> **Protección de la mucosa digestiva**
La adición de bentonita ayuda a proteger la mucosa digestiva contra daños ligados a la uremia.

> **Seguridad urinaria**
RSS* ajustada para estruvita y oxalato para ayudar a mantener la salud urinaria.

> **Riesgo de acidosis metabólica limitado**
La adición de un agente alcalinizante (carbonato de calcio) ayuda a reducir el riesgo de acidosis metabólica.

> **Limita el riesgo de hiperparatiroidismo**
La adaptación del contenido de calcio de la dieta, con un aumento de la relación Ca/P hasta 2, ayuda a limitar los efectos secundarios de la hiperfosfatemia así como el riesgo de hiperparatiroidismo secundario.

SCIENTIFICALLY PROVEN

14% DE REDUCCIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD APARENTE DEL FÓSFORO MEDIANTE LA ADICIÓN DE QUITOSÁN(1)

(1) I. Leriche et al. Effect of chitosan supplementation in a dry maintenance diet on phosphorus apparent digestibility in cats. SEVC Congress 2015.