ESTUDIO TRAVITCH

Eficacia y tolerancia de un nuevo antagonista del canal TRPV-1 (Travaderm) por vía tópica en pododermatitis en perros.



72% **Reducción media del picor**

Los VETERINARIOS consideraron la eficacia buena o excelente en un 100% de los casos.

AUTORES DEL ESTUDIO

Xavier Serra Fabregat **Clínica Veterinaria Més que Gossos** Elena Diéguez **Anicura Abros** Miguel Ángel de Pablo **Evidensia Hospital Mediterráneo** Conchita Hernán-Pérez **Centauro Veterinarios** Oliver Valero-Coppin **Universitat Autònoma de Barcelona** Elsa Genove Corominas **Vetilea**

Estudio publicado en: Veterinary Dermatology

Escanea y lee el artículo

Travaderm es eficaz y bien tolerado para las pododermatitis en perros.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue abierto, **multicéntrico con 24 perros** que acudieron a la clínica por **pododermatitis**. Todos los perros que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión se trataron únicamente con **Travaderm Spray** dos veces al día.

Se evaluaron los siguientes parámetros:

-El prurito mediante la escala analógica visual del prurito (PVAS)
-La severidad de las lesiones mediante el índice CADESI-3 adaptado a pododermatitis
-La calidad de vida (QoL) de los animales
-La presencia de infecciones secundarias
-La percepción de eficacia por parte del propietario y del veterinario

HIPÓTESIS

La reducción del valor medio de cada una de las variables **es de un 50%**

RESULTADOS

Los resultados demostraron que se cumplió la hipótesis del estudio, **reduciendo los índices iniciales más de un 50% de manera significativa**. En concreto:



1_Reducción media del picor.
(Tabla 1, Figura 1)



2_Los pacientes finalizan el estudio con un grado de picor considerado normal.



3_Reduce el índice CADESI-3 adaptado.
(Figura 2, Foto 1-4)



4_ Los veterinarios consideraron la eficacia buena o excelente



5_Los propietarios consideraron la eficacia buena o excelente.



6_Las infecciones secundarias se resuelven por sí solas

7_Mejora el índice de calidad de vida medio. (Tabla 1, Figura 3)

8_La tolerancia fue buena detectándose solo eritema incrementado en un paciente que desapareció a los pocos días.

VARIABLE	VALOR MEDIO INICIAL	VALOR MEDIO FINAL	P-VALUE
pVAS (cm)	6.7	1.9	<0.001
Índice CADESI adaptado	52.2	13.4	<0.001
Índice QoL	8.6	2.2	<0.001
Infecciones secundarias	18	2	<0.001

Tabla 1: Resumen de datos iniciales y finales de las variables medidas durante el estudio y su significancia estadística.




Figura 1:
Valores medios (±SD) de PVAS medidos en día 0, 3, 7, 14, 21 y 28.




Figura 2:
Valores medios (±SD) del índice CADESI-3 adaptado a pododermatitis medidos en día 0, 3, 7, 14, 21 y 28




Figura 3:
Valores medios (±SD) del índice QoL index medidos en día 0, 3, 7, 14, 21 y 28.

Día 1 Día 28



FOTO 1

Día 1 Día 28



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

VETILEA TRAVADERM



Útil en prurito en zonas localizadas. Ayuda a reducir la estimulación neuronal del prurito e interrumpir el ciclo prurito-rascado.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar a unos 10 cm de la piel dos veces al día sobre la superficie afectada y dejar actuar durante 10 minutos.

Como mantenimiento, aplicar dos veces por semana sobre la superficie normalmente afectada.

COMPOSICIÓN

Isopropyl Myristate, Coco-Caprylate/-Caprate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ethoxydiglycol, Hydroxymethoxyiodobenzyl Glycolamide Pelargonate, Tocopheryl Acetate. Sin parabenos.

FORMATO

Cada caja contiene un bote de spray de 60 ml.

MÁS INFORMACIÓN

Escanee este código para obtener información sobre este producto.

- NUEVO MECANISMO DE ACCIÓN: ANTAGONISTA TRPV1
- INTERRUMPE EL CICLO PRURITO RASCADO
- PRODUCTO PATENTADO



VETILEA

Vetilea SL
c/ Sant Gabriel 50
08950 Esplugues de Llobregat | Barcelona
myvetilea.com | info@vetilea.com

POWERED BY Galenicum believe in life

Veterinary Dermatology
Adaptado de Veterinary Dermatology
DOI:10.1111/vde.13185