VETILEA GASTRO



INSTRUCCIONES DE USO

Vetilea Gastro gel:
Gatos: administrar 2,5 ml
Perros: administrar 2,5 ml por cada 5 kg de peso
Otras especies: administrar 0,5 ml por cada kg de peso
Vetilea Gastro ST:
Perros-Medio comprimido por cada 10 kg de peso

COMPOSICIÓN

Vetilea Gastro gel: Glicerol, sorbitol, carbonato cálcico (10 mg/ml), alginato sódico (10 mg/ml).
Vetilea Gastro ST: Fosfato dicálcico, carbonato de calcio (250 mg/comprimido), alginato sódico (200 mg/comprimido), estearato de magnesio, saborizante.

FORMATO

Vetilea Gastro Gel: Cada bote contiene 50 ml de solución
Vetilea Gastro ST: Cada caja contiene 30 comprimidos palatables y divisibles.
Vetilea Gastro ST envase clínico: Cada envase clínico contiene 8 cajas de 15 comprimidos cada una.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código para obtener información sobre este producto.



REFERENCIAS

Henderson A.H. The use of gastroprotectants in treating gastric ulceration in dogs. Compendium on Continuing Education for the Practising Veterinarian -North American Edition- 2006, 28(5):358-370. Henderson A.H., Disruption of the gastric mucosal barrier in dogs. Compendium on Continuing Education for the Practising Veterinarian -North American Edition- 2006, 28(5):340-356. Marks SL, Kook PH, Papich MG, Tolbert MK, Willard MD. ACVIM consensus statement: Support for rational administration of gastrointestinal protectants to dogs and cats. J Vet Intern Med. 2018 Nov;32(6):1823-1840. doi: 10.1111/jvim.15337. Epub 2018 Oct 31. Boyle T.E., Gastroprotectant and antiacid therapy in veterinary medicine. 2010, IVG Newsletter Wan J., Alginate oligosaccharide-induced intestinal morphology, barrier function and epithelium apoptosis modifications have beneficial effects on the growth performance of weaned pigs. 2018, J. An. Sci. Biotech. 9(58), Horibe S, Tanahashi T, Kawauchi S, Mizuno S, Rikitake Y. Preventative Effects of Sodium Alginate on Indomethacin-induced Small-intestinal Injury in Mice. Int J Med Sci. 2016 Aug 1;13(9):653-63. doi: 10.7150/ijms.16232. Yamamoto A, Itoh T, Nasu R, Nishida R. Sodium alginate ameliorates indomethacin- induced gastrointestinal mucosal injury via inhibiting translocation in rats. World J Gastroenterol. 2014 Mar 14;20(10):2641-52. doi: 10.3748/wjg.v20.i10.2641.

Vetilea Joints Fabricado bajo los estándares GMPs

VETILEA

Vetilea SL
c/ Sant Gabriel 50
08950 Esplugues de Llobregat | Barcelona
myvetilea.com | info@vetilea.com

POWERED BY
Galenicum
believe in life

VETILEA GASTRO

EVIDENCIA CIENTIFICA





*De acuerdo a una encuesta realizada a la base de datos de veterinarios de Vetilea

Evidencia científica en calidad de vida Gastrointestinal

- Con alginato sódico y carbonato de calcio que forman una barrera protectora sobre la mucosa gástrica
- Dos formatos altamente palatables
- El primer producto con evidencia clínica en mejora de calidad de vida Gastrointestinal
- El producto mejor valorado por los veterinarios*

Vetilea Gastro Gel y **Gastro ST** son alimento complementario para perros y gatos que contienen Carbonato Cálcico y Alginato Sódico para reequilibrar el sistema gástrico y mantener la mucosa gástrica en buen estado.


LA ESTRUCTURA ALGINATO-CARBONATO

El alginato sódico junto con el carbonato cálcico que contiene Vetilea Gastro forma una estructura única de caja de huevo (egg-box), que le confiere sus propiedades únicas.



EVIDENCIA CLÍNICA**


Estudio clínico Cross-over para evaluar la eficacia de Vetilea Gastro en la calidad de vida de pacientes caninos linfoma sometidos a quimioterapia bajo el protocolo Winsonsin-Madison 19 (WM19).



Se evaluó la calidad de Vida Gastrointestinal de acuerdo al *Canine IBD Activity Index* (CIBDAI) desarrollado por Jergens (2003), que evalúa la suma de índices de los siguientes signos clínicos: apetito, náuseas, vómitos, consistencia de heces, frecuencia de deposiciones, pérdida de peso y actividad.

Resultados:

Se incluyeron 4 pacientes por Brazo de manera randomizada:





**Estudio realizado por Ricardo Ruano (HV Evidensia Mediterráneo, Ignacio Molina Anicura Estoril HV), Pascual de Rojas (Fundación Universitaria San Pablo CEU)

VETILEA GASTRO


Existe una clara tendencia a mejor calidad de vida gastrointestinal en el grupo que primero trata con Vetilea Gastro (BRAZO G). Es decir, cuanto antes empiezan a tomar Vetilea Gastro, mejor calidad de vida tienen durante los ciclos estudiados del protocolo WM19.

Además, En el BRAZO G (Gastro Primero) los valores medios de índice CIBDAI por ciclo son más bajos que en el brazo B. Es decir, cuanto antes empiezan a tomar Vetilea Gastro, mejor calidad de vida tienen los pacientes durante los ciclos estudiados del protocolo WM19.


	BRAZO B	BRAZO G
2n CICLO	1,125	0,75
3r CICLO	1,75	0,56

Por último, en el Brazo B (sin Vetilea Gastro primero) se ha tenido que dar medicación de rescate a dos individuos, ambos en la REVISIÓN 5- SEMANA 11 WM19, mientras que no se ha necesitado ningún rescate en el Brazo G.

El análisis de variables individuales, muestra que la principal mejora se obtiene sobre todo en la consistencia de las heces y en la frecuencia de las deposiciones.



Diferencias estadísticamente significativas según el brazo (p-valor=0,020).



Diferencias estadísticamente significativas según el brazo (p-valor=<0,001).

CONCLUSIÓN

Vetilea Gastro es eficaz en la mejora de Calidad de Vida Gastrointestinal en pacientes con linfoma bajo protocolo de quimioterapia Wisconsin-Madison 19.

ESTUDIO VALORACIÓN VETERINARIA

Se realizó una encuesta a veterinarios en la que evaluaron su satisfacción con la gama Vetilea Gastro, así como su palatabilidad y eficacia frente a alternativas del mercado.

Los veterinarios (n=20) muestran una satisfacción elevada con Vetilea Gastro, y consideran que mejora significativamente la palatabilidad y eficacia frente a otras alternativas.



- Totalmente satisfecho **(15%)**
- Muy satisfecho **(70%)**
- Satisfecho **(15%)**

VETILEA GASTRO