





Con 0 horas de tiempo de espera en leche de vacuno y 24 horas en leche de ovino

Dectospot 10 mg/ml

Solución para unción dorsal continua para bovino y ovino



Beneficios

- Indicado tanto para bovino de carne y lechero, como ovino y corderos.
- Actividad persistente contra las moscas mordedoras y molestas, hasta 6 semanas tras su aplicación en ambas especies.
- Protección duradera frente a garrapatas, falsas garrapatas y piojos masticadores en el ganado ovino.
- Fácil aplicación gracias a su formato Pour On.
- Una aplicación directa asegura la eliminación rápida y eficaz de miasis en ovino producidas por moscas.

LABIANA
siempre eficaz

Dectospot 10 mg/ml Solución para unción dorsal continua para bovino y ovino



COMPOSICIÓN

Deltametrina 10mg/ml

ESPECIE DE DESTINO

Bovino y ovino.

INDICACIONES

En bovino:

Para el tratamiento y la prevención de infestaciones por piojos chupadores y masticadores, lo que incluye *Bovicola bovis, Solenopotes capillatus*, *Linognathus vituli* y *Haematopinus eurysternus.*

Además, como ayuda en el tratamiento y la prevención de infestaciones por moscas mordedoras y molestas, lo que incluye *Haematobia irritans*, *Stomoxys calcitrans, Musca species* y *Hydrotaea irritans.*

En ovino:

Para el tratamiento y la prevención de infestaciones por garrapatas *Ixodes ricinus* y por piojos (*Linognathus ovillus*, *Bovicola ovis*), falsas garrapatas (*Melophagus ovinus*) y para el tratamiento del ataque establecido de la mosca de la carne (habitualmente *Lucilia* spp.).

En corderos: Para el tratamiento y la prevención de infestaciones por garrapatas *Ixodes ricinus* y por piojos *Bovicola ovis*.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales convalecientes o enfermos.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

El uso extraoficial del medicamento veterinario en especies no destino, como perros y gatos, puede provocar signos de toxicidad neurológica (ataxia, convulsiones, temblores), signos digestivos (hipersalivación, vómitos) y resultar mortal.

No usar en animales con lesiones extensas en la piel.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA

Gestación y lactancia:

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia.

Los estudios de laboratorio efectuados en ratas y conejos no han demostrado efectos teratogénicos.

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Para unción dorsal continua.

Posología:

Bovino: 100 mg de deltametrina por animal, que corresponden a 10 ml del medicamento veterinario.

Ovino: 50 mg de deltametrina por animal, que corresponden a 5 ml del medicamento veterinario.

Corderos (menos de 10 kg de peso vivo o 1 mes de edad): 25 mg de deltametrina por animal, que corresponden a 2,5 ml del medicamento veterinario.

Administración:

El medicamento veterinario debe aplicarse sin dilución en el punto medio entre las paletillas.

Para el tratamiento y la prevención de infestaciones por garrapatas, falsas garrapatas y piojos en ovino, se debe apartar el vellón y se debe aplicar el medicamento veterinario sobre la piel del animal. Para una máxima eficacia, se aconseja: tratar a los animales poco después de esquilarlos (animales con vellón corto), mantener a las ovejas tratadas separadas de las ovejas sin tratar, para evitar una nueva infestación.

SOBREDOSIFICACIÓN

Se han detectado algunos efectos adversos después de una sobredosificación. Estos incluyen parestesia e irritación en bovino, así como micción intermitente e infructuosa en corderos jóvenes. Estos han demostrado ser leves, transitorios y se resuelven sin tratamiento.

TIEMPO DE ESPERA

Bovino:

Carne : 18 días

Leche: cero horas

Ovino:

Carne : 35 días

Leche: 24 horas

Debido a la probabilidad importante de contaminación cruzada de animales no tratados con este medicamento veterinario debido al acicalado (lamidos), los animales tratados se deben mantener separados de los animales no tratados a lo largo del tiempo de espera máximo. La falta de cumplimiento de esta recomendación puede provocar la presencia de residuos en los animales no tratados.

PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS

La molécula de la deltametrina pertenece a la familia de los piretroides sintéticos. Se caracteriza por su actividad insecticida y acaricida, actuando mediante la alteración de la permeabilidad de la molécula del canal de sodio, provocando hiperactivación, seguida por parálisis (efecto fulminante), con temblores y mortalidad de los parásitos. Es probable que dos mecanismos fisiológicos contribuyan a la resistencia a la deltametrina: mutación de la diana molecular de la deltametrina o selección genómica que aumenta la expresión de las enzimas mitocondriales oxidasa y esterasa.

PERÍODO DE VALIDEZ

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años.

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close,
Tallaght, Dublin 24
Irlanda

REPRESENTANTE DEL TITULAR

Labiana Life Sciences S.A.
C/ Venus, 26
08228 Terrassa (Barcelona)
España
Tel.: +34 937 36 97 00

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3489 ESP

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

LABIANA
siempre eficaz

Junio 2024