VetPlus
Technical

KAMINOX®



KAMINOX® es un suplemento nutricional para perros y gatos que ayuda a mantener los niveles normales de potasio en el organismo. Viene en forma líquida o en sobres para ayudar con la niveles administración.

Uso:	KAMINOX® es un alimento complementario para ayudar en el mantenimiento de los niveles de potasio en perros y gatos.
Presentación:	KAMINOX® Líquido: Una formulación líquida de color marrón con pipeta dosificadora. KAMINOX® Sobres: Polvo marrón en sobres con cuchara dosificadora incluida.
Composición:	**KAMINOX® Líquido - Cantidad por 2ml:** Gluconato de potasio 468 mg (2 mEq) Mezcla patentada de aminoácidos 6,67 mg Espirulina 300 mcg Vitamina B1 (Hidrocloruro de tiamina) 1 mg Vitamina B2 (Riboflavina) 1 mg Vitamina B3 (Niacinamida) 5 mg Vitamina B5 (D-pantotenato de calcio) 5 mg Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina) 1 mg Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2 mcg Hierro elemental 70 mcg **KAMINOX® Sobres - Cantidad por sobre de 5,4g:** Gluconato de potasio 4.16 g (17.8 mEq) Vitamina B1 (Hidrocloruro de tiamina) 2 mg Vitamina B2 (Riboflavina) 2,6 mg Vitamina B3 (Niacinamida) 8,5 mg Vitamina B5 (D-pantotenato de calcio) 7,5 mg Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina) 2 mg
Guía de Administración:	KAMINOX® Líquido: Puede administrarse directamente o añadirse al alimento. 2 ml por 4,5 kg de peso corporal de una a tres veces al día (o según el grado de deficiencia de potasio). Agitar bien antes de usar. KAMINOX® Sobres: Un sobre por 40 kg, de una a tres veces al día (aproximadamente igual a una cucharada por 10 kg, de una a tres veces al día) **Concentración Sérica de Potasio (mEq/L):** — **Cantidad:** <3 — 2 ml por 4,5 kg o un sobre por 40 kg tres veces al día 3 - 3.5 — 2 ml por 4,5 kg o un sobre por 40 kg dos veces al día 3.5 - 4 — 0,5-1 ml por 4,5 kg o medio sobre por 40 kg dos veces al día
Advertencias:	Usar con precaución en animales que padezcan enfermedades cardíacas. No administrar a animales con enfermedades donde se puedan encontrar niveles elevados de potasio como: insuficiencia renal aguda u oligúrica, hipoadrenocorticismo, deshidratación aguda u obstrucción uretral. No es un alimento completo. Mantener fuera del alcance de niños. No apto para consumo humano.
Almacenamiento:	15 - 25°C, mantener alejado de la luz solar directa.
Envasado:	Botella de plástico de 60 ml y 120 ml con pipeta dosificadora calibrada o caja de 30 sobres de 5,4 g con cuchara dosificadora.