MULTI VITAMIN

Solución Multivitamínica

Combinación superior de vitaminas para un efectivo saludable

VITAMINA B5

VITAMINA C

VITAMINA B1

VITAMINA B2

VITAMINA B6

VITAMINA D3

VITAMINA B3

VITAMINA A

VITAMINA E

VITAMINA B12





www.hifarmax.com geral@hifarmax.com facebook.com/hifarmax

HiFarmaX Veterinary Innovation

MULTI VITAMIN

Composición (por ml)

Vitamina A	50.000 UI	Vitamina B_2	2.1 mg
Vitamina D_3	25.000 UI	Vitamina B_3	12.5 mg
Vitamina E	4 mg	Vitamina B_5	3 mg
Vitamina C	2 mg	Vitamina B_6	1.25 mg
Vitamina B_1	2.5 mg	Vitamina B_{12}	30 µg

Para conocer la composición completa, consulte la etiqueta y la caja del producto

- Suplemento multivitamínico para apoyar a los animales en condiciones relacionadas con el estrés, períodos de recuperación o baja productividad. Permite apoyar el crecimiento y mantener funciones corporales saludables.

Especie de destino Bovinos, equinos, pequeños rumiantes, porcinos y perros.

Posología y vía de administración Administración oral.

El producto puede administrarse a animales individuales y/o grupos de animales, a través de alimentos o agua, para complementar las necesidades diarias.

Especie	Dosis Recomendada
• Bovinos y Caballos	10 - 20 ml
• Terneros, potros y pequeños rumiantes	5 - 10 ml
• Cerdos	10 ml

Especie	Dosis Recomendada
• Lechones (10-30 kg)	1 - 3 ml
• Lechones (10 kg)	1 ml
• Corderos	2 - 3 ml
• Perros	0.5 ml

Vitamina A La deficiencia puede conducir a la cornificación de la piel y las membranas mucosas con el consiguiente riesgo de infección; retraso en la maduración de óvulos y embriones, mortalidad embrionaria y un mayor riesgo general de infecciones.

Vitamina D_3 Los niveles bajos pueden provocar alteraciones del metabolismo del calcio y fosfato, inhibición de la mineralización ósea durante el crecimiento, huesos y articulaciones deformados, trastornos del crecimiento y fracturas óseas espontáneas.

Vitamina E La deficiencia puede provocar daños en el corazón y los músculos esqueléticos, muerte súbita, trastornos de la fertilidad, encefalomalacia, una postura anormal de la cabeza y movimientos descoordinados, así como daño hepático.

Vitamina B_1 La deficiencia afecta principalmente a los sistemas nervioso y cardíaco, así como a los tejidos vasculares, causando polineuritis, espasmos, parálisis e insuficiencia cardíaca. También puede observarse una ingesta reducida de materia seca, depresión y debilidad generalizada del animal.

Vitamina B_2 Los niveles bajos pueden provocar retrasos en el crecimiento y una mala conversión alimenticia.

Vitamina B_3 La deficiencia puede provocar trastornos funcionales del sistema nervioso, la piel, retrasos en el crecimiento, inflamación y úlceras de las membranas mucosas.

Vitamina B_5 Deficiencia puede provocar cambios en la piel y las membranas mucosas, pérdida de pigmentación, alopecia y pérdida de plumas, disminución de la síntesis de hormonas esteroides y disminución del consumo de alimentos.

Vitamina B_6 Los niveles bajos pueden provocar alteraciones en el crecimiento y una reducción de la ingesta de alimentos, lo que conduce a perdidas de rendimiento.

Vitamina B_{12} La deficiencia conduce a cambios en el recuento de glóbulos rojos, alteraciones en el metabolismo de las proteínas, enfermedades del sistema nervioso y reducción de la eficiencia alimentaria.

Vitamina C La deficiencia de vitamina C puede resultar en una mayor susceptibilidad a infecciones y factores estresantes (estrés por calor, vacunas), retrasos en el crecimiento y disminución de las tasas reproductivas.

Rua do Fojo 136 • Pavilhão B Trajouce • 2785-615 São Domingos de Rana • Portugal
Tel +351 214 571 • geral@hifarmax.com • www.hifarmax.com Siga-nos

HiFarmaX Veterinary Innovation