
# VITAMIN AD$_3$E

## Solución Vitamínica









- Apoya la producción de carne y leche
- Resistencia a las enfermedades
- Mejora de la fertilidad
- Crecimiento saludable
- Mejora de los parámetros de producción

www.hifarmax.com geral@hifarmax.com facebook.com/hifarmax

HiFarmaX Veterinary Innovation

# VITAMIN AD$_3$E

## Composición (por ml)

| | |
|---|---|
| Vitamina A (Palmitato de retinilo) | 150 000 UI |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 10 000 UI |
| Vitamina E (Acetato de tocoferilo) | 50 mg |

Para conocer la composición completa, consulte la etiqueta y la caja del producto.

Recomendado para su uso como coadyuvante en condiciones de carencias de vitamina A, D3 y E.

**Especies objetivo** Bovinos, equinos, pequeños rumiantes, porcinos, perros y gatos.

**Posología y vía de administración** Administración oral.

El producto puede administrarse a animales individuales y/o grupos de animales a través de pienso o agua, para complementar la ración diaria, según las necesidades.

| Especie | Dosis Recomendada |
|---|---|
| • Bovinos y caballos | 5 – 10 ml |
| • Terneros y cerdos | 2 – 5 ml |
| • Pequeños rumiantes y lechones | 1 – 3 ml |
| • Corderos y Cabritos | 0.5 – 1 ml |
| • Perros | 1 – 4 ml |
| • Gatos | 1 – 2 ml |

**Vitamina A** La deficiencia puede provocar infecciones, causadas por la cornificación de la piel y las membranas mucosas. Además, puede provocar retrasos en la maduración de los óvulos y mortalidad embrionaria.

**Vitamina D$_3$** Los niveles bajos de vitamina D3 pueden provocar trastornos del metabolismo del calcio y del fosfato, inhibición de la mineralización ósea durante el crecimiento, huesos y articulaciones deformados, trastornos del crecimiento y fracturas óseas espontáneas.

**Vitamina E** La deficiencia puede provocar lesiones en los músculos cardíacos y esqueléticos, muerte súbita, trastornos de la fertilidad, cambios en el sistema vascular y nervioso, edema en el cerebelo debido al aumento de la secreción plasmática, lo que lleva a movimientos descoordinados y una posición anormal de la cabeza. También puede causar daño hepático, cambios en la movilización de grasas, trastornos locomotores y enfermedad del músculo blanco debido a cambios distróficos en terneros y corderos.

**Presentación** Frasco de 100 ml.

**Fecha de caducidad** 3 años después de la fecha de fabricación.

Rua do Fojo 136 • Pavilhão B Trajouce • 2785-615 São Domingos de Rana • Portugal
Tel +351 214 571 • geral@hifarmax.com • www.hifarmax.com Siga-nos

HiFarmaX Veterinary Innovation